



# Oligo 8 Fe

**ΔΙΑΛΥΜΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ  
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟ**

**ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ.**

**(14-0-0+Fe)**

Σύνθεση	%β/β
Ολικό Άζωτο (N)	14
Άζωτο από ουρία	14
Υδατοδιαλυτός σίδηρος (Fe)	8



Το Oligo-8 Fe είναι διάλυμα λιπάσματος με βάση το σίδηρο για την πρόληψη - θεραπεία έλλειψης αυτού του στοιχείου, σε οπωροφόρα, λαχανικά, ανθοκομένα και φυτά μεγάλης καλλιέργειας. Το Oligo-8Fe εφαρμόζεται με ψεκασμούς φυλλώματος και στο έδαφος, προληπτικά ή θεραπευτικά με την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Ελειψη αυτού του στοιχείου παρατηρείται σε εδάφη αλκαλικά αισθετώδη, όταν υπάρχει υπερβολική υγρασία στην περιοχή των ρίζων και όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές. Η έλλειψη σίδηρου προκαλεί χαρακτηριστική χλώρωση στην κορυφή του φυτού στα νεαρά εκπτυσσόμενα φύλλα, με τελική ξήρανση τους. Τα άκρα των βλαστών αποφυλλώνονται και οι καρποί είναι λίγοι και μικροί. **Δοσολογία:** 100-300 κυβ.εκ. / 100 λίτρα νερό για ψεκασμούς φυλλώματος ή 2-4 λίτρα σε 1 στρέμμα για εφαρμογές από το έδαφος. **Εφαρμογές:** **Αμπέλι:** Εφαρμόζουμε νωρίς την Ανοίξη με την έκπτυξη των ματών. **Εσπεριδοειδή:** Εφαρμόζουμε νωρίς την Ανοίξη με την έναρξη της νέας Ανοιξιάτικης βλάστησης, 2-3 φορές. **Οπωροφόρα:** Την άνοιξη ψεκάζουμε 2-3 φορές σε διασπήματα 15 ημερών πριν την άνθιση και μετά το δέσιμο. **Ακτινίδιο:** Εφαρμόζουμε 2-4 φορές πριν την άνθισφορία και μετά το δέσιμο ανάλογα με την ένταση των συμπτωμάτων. **Τομάτα - Αγγούρι - Διάφορα λαχανικά:** Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων εφαρμόζουμε 3-4 φορές, ανά 15 ημέρες. **Μπανάνη-Τριφύλλια:** Εφαρμόζουμε 2-3 φορές πριν την άνοιξη σε νεαρό φύλλωμα. **Φράουλα:** Εφαρμόζουμε την Ανοίξη μόλις εμφανιστούν οι χλωρώσεις, 2-3 φορές σε διασπήματα 15 ημερών. **Ανθοκομικά (γαρδένια, αζαλέα, ορτανσία):** Εφαρμόζουμε 2-3 φορές, κάθε 10-15 ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. **Συνδυαστικότητα:** Συνδυάζεται με τα περισσότερα σκευάσματα φυτοπροστασίας. Μην χρησιμοποιείτε μεγαλύτερες δόσεις από τις συνιστώμενες. Αποφύγετε συνδυασμούς με πολτούς.



**Προσοχή**

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
- Προκαλεί σοβαρό οιθαλμικό ερεθισμό

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:** Φυλλάσσεται στην κλειστή συσκευασία του σε σκερό και δροσερό μέρος, χωρίς υγρασία έως 3 χρόνια.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνέχιστε να ξεπλύνετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν οισθανθείτε αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παραπρηθεί ερεθισμός του δέρματος; Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούκα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Εάν δεν υποκωρεί ο οιθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Τηλ. Κέντρου Διπλητηριάσεων 210 7793777.

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 L**

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.



Παρασκευάζεται & συσκευάζεται από τη:

**ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε., ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ**

280 χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας, 190 14 Αθίδης, Αττικής

Τηλ.: 22950 45100, e-mail: info@viorylagro.gr, www.viorylagro.gr