

# ACARIDOIL 13SL

Potassium salts of fatty acids 13%

ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)

Εγγυημένη σύνθεση: Potassium salts of fatty acids  
(άλατα καλίου λιπαρών οξέων): 13,04 β/ο  
βοηθητικές ουσίες: 83,27% β/β

Περιέχει caraway seed oil. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

**Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο για την καταπολέμηση  
του αλευρώδη σε τομάτα και αγγούρι. Συνιστάται επίσης  
για αφίδες, θρίπες, ακάρεα, κοκκοειδή, βαμβακάδα,  
ψύλλα, βρωμούσες και τζτζικάκια, για τις καλλιέργειες  
που αναγράφονται στο φάσμα δράσης. Δρα δι' επαφής.**



Προκαλεί ερεθισμό του  
δέρματος.

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό  
ερεθισμό.

Πολύ τοξικό για τους  
υδρόβιους οργανισμούς,  
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ  
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14.534 /24-09-2015



Κάτοχος της αδείας - Παρασκευαστής ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε.,  
Χημική και Γεωργική Βιομηχανία, Επιστημονική έρευνα  
280 xλμ, Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, 190 14 ΑΦΙΔΝΕΣ,  
ΤΗΛ: 22950 45100, e-mail: info@viorylagro.gr  
Εργοστάσιο παραγωγής: ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε. Ελεόνας Θηβών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 L

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης φυλλώματος. Το νερό που θα χρησιμοποιούθει δεν πρέπει να είναι «σκληρό». Αν είναι δυνατό να χρησιμοποιείται βρόχινο ή αποσταγμένο νερό. Δεν πρέπει να γίνεται εφαρμογή με μεγάλη υγρασία. Δεν πρέπει να ψεκάζονται φυτά που βρίσκονται σε κατάσταση stress. **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Ρίχνουμε μέσα στο ψεκαστικό δοχείο την απαιτούμενη δόση. Συμπληρώνουμε στη συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση. Η ανάδευση του ψεκαστικού διαλύματος συνεχίζεται μέχρι τον τερματισμό του ψεκασμού. **ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** —

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:** Συστίνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προπογουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:** Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επονομαρίανση των εντόμων. Για όλες τις καλλιέργειες στο φάσμα δράσης: Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιέργεια/κή περίοδο: 4. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 7-10 ημέρες. Πεδίο Εφαρμογής: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Λε-

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΣΙΣ:** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα απολικής προστασίας για τα ματία / πρόσωπο. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Μαζέψτε τα χυμένη ποσότητα. **Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Περιέχει caraway seed oil. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Εάν παραπτηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπωματική θεραπεία. **ΤΗΛΕΦΟΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** 210 77 93 777.

**μονία, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Γκρέιπ-φρουτ:** Για Αλευρώδη, Αφίδες, Κοκκοειδή, Θρίπες και Ακάρεα, με 1900 κ.εκ. σε 100 λίτρα ψεκ.

υγρού ανά στρέμμα. **ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αρμυδαλιά, Φουντουκιά, Καρυδιά):** Για Αφίδες, Θρίπες, Κοκκοειδή, Ακάρεα με 1900 κ.εκ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα. **ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μπλιά, Άχλαδιά):** Για Αφίδες, Κοκκοειδή, Θρίπες, Ψύλλα και Ακάρεα με 1900 κ.εκ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά):**

Για Αφίδες, Θρίπες, Κοκκοειδή, Βαμβακάδα, Ακάρεα, με 1900 κ.εκ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα. **ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υ+Θ): (Τομάτα, Αγγούρι, Πιπεριά, Μελιτάνια, Φασόλι, Μπιζέλι, Κολοκυνθειόδη, Λάχανο, Κουνουπίδι).** Για Αλευρώδεις, Αφίδες, Βρωμούσες, Θρίπες, Τούτα και Ακάρεα με 1500-1900 κ.εκ. σε 100 λίτρα και με 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα. **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ, ΦΥΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ:** Για Αφίδες, Θρίπες, Κοκκοειδή και Ακάρεα με 1500-1900 κ.εκ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα. **Παραπήρων:** Στις καλλιέργειες υπαίθρου, να μην εφαρμόζεται κατά την περίοδο της ανθοφορίας, όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας και σε περίπτωση που εμφανιζεται μελίτωμα. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Να μην εισέρχονται άνθρωποι ή ζώα στην περιοχή πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό. Αν εσέλθει εργαζόμενος στην περιοχή μετά τον περιοχή πριν στεγνώσει το ψεκασμό, να φορά γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. **Στοιχεία φυτοτεξικότητας, ευαισθησίας ποικιλών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης. Στην αχλαδιά να χρησιμοποιείται η χαμηλότερη δόση και να προηγείται δοκιμή στις ευαίσθητες ποικιλίες. **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Για όλες τις καλλιέργειες του φάρματος δράσης: —.

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Να αποθηκεύεται σε ξέρο, δροσερό, κλειστό και καλά αεριζόμενο χώρο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία πάρασκευής του. Να προστατεύεται από συνθήκες παγετού. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

**ΚΥΠΡΟΣ:** Αρ. Αδειας: 2664

1στρέμμα = 1 δεκάριο

**Τηλ Κέντρου Διληπτηρίασης:** 1401

Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά/ Διανομέας  
L. Lambrou Agro Ltd, Οθέλλου 11, 2540 Δάλι  
Βιομ. περιοχή Ιδαίου, τηλ: 22667908  
e-mail: info@lambrouagro.com.cy

**Ημερομηνία παραγωγής:** Αρ. παρτίδας: επί της συσκευασίας