



# Aminocal Ca

**ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ  
(8-0-0 +16 CaO)**

**Ομάδα Γ: Οργανοχημικό λίπασμα κύριου  
στοιχείου (αζώτου) και δευτερεύοντος  
(ασβεστίου) στοιχείου  
Αρ. κυκλοφορίας: 111**

**Με 33% CaCl<sub>2</sub> & 30% οργανική ουσία  
Σύμπλοκο ασβεστίου με αμινοξέα**

Εγγυημένη σύνθεση: % β/β

Ολικό Άζωτο (N)	8
Άζωτο από ουρία	3,7
Οργανικό Άζωτο	4
Νιτρικό Άζωτο(NO <sub>3</sub> )	0,3
Διαλυτό ασβέστιο (CaO)	16
Οργανική ουσία	30
pH	4,2
Αγωγιμότητα	10,5SmS/cm
Λόγος C:N	2
100% διαλυτό στο νερό	



**33% L-αμινοξέα για αύξηση & βελτίωση παραγωγής.** Το AMINOCAL περιέχει αμινοξέα υψηλής βιολογικής αξίας σε σύμπλοκο με το ασβέστιο. -Αυξάνει την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών και παράλληλα ανημετωπίζει την έλλειψη ασβεστίου. -Ανακουφίζει τα φυτά από το στρες που προκαλεί η μεγάλη καρποφορία, οι προβολές από ιώσεις και οι δυσμενείς κλιματικές συνθήκες. -Συμβάλλει στην αύξηση του μεγέθους των καρπών και του υπογείου τμήματος σε ριζωματοδές καλλέργειες. -Αυξάνει την ανοχή τους στη συνήθηση και τις μεταφορές και την δραστηριότητα των ωφέλιμων μικροοργανισμών του εδάφους όταν εφαρμόζεται με πότισμα. Ενισχύει την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τη ρίζα. **ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:** Για διαφυλλικού ψεκασμού: 200-300 κ.εκ. σε 100 λίτρα νερό. Για υδρολίπανση: 0,5-1 λίτρο στο στρέμμα. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Τομάτα-Πιπεριά-Μελιτζάνα:** Για την πρόληψη της Ετήσιας καρφικής ψεκάζουμε καλύπτοντας καλά τους καρπούς. Επαναλαμβάνουμε 2 φορές κάθε 7-10 ημέρες. **Καρπούζι-Πεπόνι-Αγγούρι-Κολοκύθη:** Πρόληπτικά ψεκάζουμε 2-3 φορές σε διαστήματα 10 ημερών την εποχή της ταχείας αύξησης των καρπών. **Μαρούλι λάχανο-κουρουπιό-σέλινο-άλλα λαχανικά:** Ψεκάζουμε με τα πρώτα συμπτώματα. Επαναλαμβάνουμε 2-3 φορές κάθε 10 ημέρες. **Πατάτο-Κρεμμύδι:** Εφαρμόζεται με 2-3 ψεκασμούς σε διάστημα 15 ημερών όταν αρχίσουν να σχηματίζονται οι κόνδυλοι/βολβοί. **Βαμβάκι:** Ψεκάζουμε 2-3 φορές στα νεαρά στάδια για αύξηση της ζωηρότητας και ανοχή στις ασθένειες. **Αμπέλι:** Γίνονται 2-4 εφαρμογές καλύπτοντας καλά τα σταφύλια, μετά το δέσιμο την περίοδο της ανάπτυξης της ράγας. **Φρούτα:** Ψεκάζουμε 2-3 φορές μετά το δέσιμο σε διαστήματα 10 ημερών. **Πυρηνόκαρπα:** Ψεκάζουμε 2-3 φορές την περίοδο της ταχείας ανάπτυξης των καρπών για αύξηση της συνεκτικότητας της σφάκας τους και ανοχή στη μεταφορά. **Μηλιές-Αχλαδιές:** Για την πρόληψη της εμφάνισης της πικρής κηλίδωσης, ψεκάζουμε 3 φορές σε διάστημα 20 ημερών ξεκινώντας από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο. Μην ψεκάζετε με υψηλές θερμοκρασίες. **Ακτινίο:** Ψεκάζουμε την περίοδο ανάπτυξης των καρπών και ιδιαίτερα προς την ωρίμανση για ανοχή στη συνήθηση. **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ/ΟΔΗΓΙΕΣ:** Γεμίζουμε το ψεκαστικό μηχανήμα μέχρι την μέση με νερό, ρίχνουμε την ανάλογη δόση, αναθεύουμε καλά και συμπληρώνουμε με τον υπόλοιπο όγκο νερού. **Συνδυαστικότητα:** Αποφύγετε συνδυασμούς με πολλούς και προϊόντα που δεν είναι συμβατά με το ασβέστιο. Να φυλάσσεται κλειστά σε σκιερό και δροσερό μέρος χωρίς υγρασία. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα για τη χρήση και μεταχείριση του προϊόντος. Το προϊόν περιέχει πρώτες ύλες ζωικής προέλευσης και προούνται οι υγειονομικοί κανόνες όπως αυτο ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1069/2009 (ΕΕ L 300) και στον Κανονισμό (ΕΕ) 142/2011 (ΕΕ L 54), όπως κάθε φορά ισχύουν. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210. 7793777

**Προσοχή.** Περιέχει νηρικό ασβέστιο & χλωριούχο ασβέστιο. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

**Να φοράτε προστατευτικά μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.**



**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΙΤΡΑ** 5 □ 12 □ 20 □

Παρασκευάζεται από την: **ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε., ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ**  
28ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας, 190 14 Αφίδες  
Τηλ.: 22950 45100, e-mail: info@viorylagro.gr, www.viorylagro.gr