


# Aminoplus

## ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ (8-0-0 +16 CaO, Zn B)

Ομάδα Γ: Οργανοχημικό λίπασμα κύριου στοιχείου (αζώτου) και δευτερεύοντος (ασβεστίου) στοιχείου  
Αρ. κυκλοφορίας: 111

Με 33% CaCl<sub>2</sub> & 30% οργανική ουσία

Σύμπλοκο ασβεστίου με αμινοξέα



Εγγυημένη σύνθεση:	% β/β	Εγγυημένη σύνθεση:	%β/β
Ολικό Άζωτο (N)	8	Βόριο (B)	3
Άζωτο από ουρία	3,7	Οργανική ουσία	30
Οργανικό Άζωτο	4	pH	4,2
Νιτρικό Άζωτο (NO <sub>3</sub> )	0.3	Αγωγιμότητα	10,5SmS/cm
Διαλυτό ασβέστιο (CaO)	16	Λόγος C:N	2
Ψευδάργυρος (Zn)	3	100% διαλυτό στο νερό	

**33% L-αμινοξέα για αύξηση & βελτίωση παραγωγής.** Το AMINOPLUS περιέχει αμινοξέα υψηλής βιολογικής αξίας σε σύμπλοκο με το ασβέστιο. - Αυξάνει την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών και παράλληλα αντιμετωπίζει την έλλειψη ασβεστίου. - Ανακουφίζει τα φυτά από το στρες που προκαλεί η μεγάλη καρποφορία, οι προσβολές από ιώσεις και οι δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες. - Συμβάλλει στην αύξηση του μεγέθους των καρπών και του υπογείου τμήματος σε ριζωματώδεις καλλιέργειες. - Αυξάνει την αντοχή τους στη συντήρηση και τις μεταφορές και την δραστηριότητα των ωφέλιμων μικροοργανισμών του εδάφους όταν εφαρμόζεται με πότισμα. Ενισχύει την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τη ρίζα. **ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ:** Για διαφυλλικούς ψεκασμούς: 200-300 κ.εκ. σε 100 λίτρα νερό. Για υδρολίπανση: 0,5 - 1 λίτρο στο στρέμμα. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Τομάτα-Πιπεριά-Μελιτζάνα:** Για την πρόληψη της ξηρής κορυφής ψεκάζουμε καλύπτοντας καλά τους καρπούς. Επαναλαμβάνουμε 2 φορές κάθε 7-10 ημέρες. **Καρπούζι-Πεπόνι-Αγγούρι-Κολοκύθι:** Προληπτικά ψεκάζουμε 2-3 φορές σε διαστήματα 10 ημερών την εποχή της ταχείας αύξησης των καρπών. **Μαρούλι λάχανο-κουκουπίδι-σέλινο-άλλα λαχανικά:** Ψεκάζουμε με τα πρώτα συμπτώματα. Επαναλαμβάνουμε 2-3 φορές κάθε 10 ημέρες. **Πατάτα-Κρεμμύδι:** Εφαρμόζεται με 2-3 ψεκασμούς σε διάστημα 15 ημερών όταν αρχίσουν να σχηματίζονται οι κόνδυλοι/βολβοί. **Βαμβάκι:** Ψεκάζουμε 2-3 φορές στα νεαρά στάδια για αύξηση της ζωηρότητας και αντοχή στις ασθένειες. **Αμπέλι:** Γίνονται 2-4 εφαρμογές καλύπτοντας καλά τα σταφύλια, μετά το δέσιμο την περίοδο της ανάπτυξης της ράγας. **Φράουλα:** Ψεκάζουμε 2-3 φορές μετά το δέσιμο σε διαστήματα 10 ημερών. **Πυρηνόκαρπα:** Ψεκάζουμε 2-3 φορές την περίοδο της ταχείας ανάπτυξης των καρπών για αύξηση της συνεκτικότητας της σάρκας τους και αντοχή στη μεταφορά. **Μηλιές-Αχλαδιές:** Για την πρόληψη της εμφάνισης της πικρής κηλίδωσης, ψεκάζουμε 3 φορές σε διαστήματα 20 ημερών ξεκινώντας από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο. Μην ψεκάσετε με ψηλές θερμοκρασίες. **Ακτινίδιο:** Ψεκάζουμε την περίοδο ανάπτυξης των καρπών και ιδιαίτερα προς την ωρίμανση για αντοχή στη συντήρηση. **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ/ΟΔΗΓΙΕΣ:** Γεμίζουμε το ψεκαστικό μηχάνημα μέχρι την μέση με νερό, ρίχνουμε την ανάλογη δόση, αναδεύουμε καλά και συμπληρώνουμε με τον υπόλοιπο όγκο νερού. **Συνδυαστικότητα:** Αποφύγετε συνδυασμούς με πολλούς και προϊόντα που δεν είναι συμβατά με το ασβέστιο. Να φυλάσσεται κλειστό σε σκιερό και δροσερό μέρος χωρίς υγρασία. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα για τη χρήση και μεταχείριση του προϊόντος. Το προϊόν περιέχει πρώτες ύλες ζωϊκής προέλευσης και τηρούνται οι υγειονομικοί κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1069/2009 (ΕΕ L 300) και στον Κανονισμό (ΕΕ) 142/2011 (ΕΕ L 54), όπως κάθε φορά ισχύουν. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

**Προσοχή.** Περιέχει νιτρικό ασβέστιο & χλωριούχο ασβέστιο. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Να φοράτε προστατευτικά μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: **1 L**

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.



Παρασκευάζεται και συσκευάζεται από τη:

**VIORYL A.E., ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ**

28ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας, 190 14 Αφιδνες

Τηλ.: 22950 45100, e-mail: info@viorylagro.gr, www.viorylagro.gr