

WP Φρέζιμη
Μανκοζεβ (Μανκοζέμη) 80%

80 WP MANCOZEB BIOFYA

MANCOZEB BIOFYA 80 WP

Mancozeb (Μανκοζέμη) 80%, WP βρέξιμη σκόνη

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος. **Τρόπος παρασκευής φεκαστικού υγρού:**

Γερίζουμε το δοχείο του φεκαστικού μπανάνισμας με νερό μέχρι την μεσημέρια. Προσθέτουμε αναδέυντας στη συστατικήν δύο στρέμματα. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδέυντας συνεχώς. **Κεθαρισμός φεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το δοχείο του φεκαστικού. Επιλύνετε τα μεταχνήματα εξωτερικά με νερό. Επιλύνετε το εσωτερικό του δοχείου του φεκαστικού με νερό συμπεριλαμβανομένων των αριθμητικών που αναγράφονται για τον όγκο αυτό το ένα τρίτο του διώρου του φεκαστικού δοχείου. Γεμίστε το φεκαστικό δοχείο με καθαρό νερό κατά την διαδικασία. Γεμίστε το δοχείο του φεκαστικού κατά το δύναμα με νερό, προσθέτες καθαριστικό με βάση την αριθμία (συγκέντρωση 0,03%) αναδέυτε για 2 λεπτά και γειτούντε το φεκαστικό με καθαρό νερό. Αφήστε για 15 λεπτά ωρις αναδέυτε και κατόπιν αδειάστε το δοχείο με πίεση μέσα από αναλύσεις και βραχίονες. Αδειάστε τελείως το φεκαστικό δοχείο. Φίλτρα και μπεκάκια αφαρούνται και καθαρίζονται ξεχωριστά με καθαρό νερό. **Συνδυαστικότητα:** Στα μπλετάτη το MANCOZEB BIOFYA μπορεί να συνδυαστεί με τα σκευάσματα Indar 5 EW και Systane 6 SC. **Οδηγίες για την ασφαλή απόφαση του φροτατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Καινά σε γεγκινέμια για τον ακόντιο εγκαταστάσεις, βάση της κείμενης νομοθεσίας. Τα κενά υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκοπό για την διασφάλιση της μη περιπέτειας για την ασφάλεια στη συσκευασία. **ΦΛΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Πλεύς Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Μηλοειδή, Μηλιά - Αχλαδί: για την αντιμετώπιση του φυσκιλάδιου (Venturia inaequalis, Venturia prina) με 200 γρ/στρέμμα και με 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Γνοντοί εφαρμογές από τη στάδιο της πράσινης κορύφης και εφόδους οι συνθήκες ευνούν την αντιμετώπιση από καθαρό νερό. Αδειάστε το σκευάσματος από την αριθμητική τους συσκευασίας. Καταστρέψτε την εγκαταστάσεις με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες σε εναλλαγή με άλλα μικτοκτόνα. **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Το MANCOZEB BIOFYA πρέπει να χρησιμοποιείται προκεκτώντας να αποφεύγεται η ανάπτυξη ανθεκτικότητάς του σε μικτοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης. **Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα:** Η χρήση του σκευάσματος σε 250 γρ/στρέμμα και με 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα από το 2ο σύλλογο και έπειτα. Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόδους αποτελείται.

Χρονικό διάστημα ασφαλέστερης μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Δεν εφαρμόζεται στην περιπτώση των πολεμικών καλλιέργειών. Γενικά πρέπει να προτίθενται οι σδημές χρήσης της επικέτας όπως προς τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος σε κάθε προτεινόμενη καλλιέργεια.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Η ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥΣ.

Δεν είναι φυτοτοξικό στην προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Να μην χρησιμοποιείται στις ποικιλίες της ακλαδίας Κρυσταλλί, Κόσια και Βουτρότα. Μπορεί να προκαλέσει σκωριώσκων σε μηλές ποικιλίας Goldene Delicious.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά ήταν πρόκειται για μετασύλλεκτες ρίζες;

(Τομάτα, Μελιτάνια, Πιπεριά, Κολοκυνθή, Κολοκύθα, Πεπόνι) υπόθιρο: 3 ημέρες. Ποτάτα: 7 ημέρες, Μηλιά, Αχλαδί, Αμπελό (Επιπραέδες και Οινοποιίες ποικιλίες). Κρεμμύδια, Λακούνια (Εσπελότ), Σκόρδο και Μαρούνι υπόθιρο: 28 ημέρες. Καρότο: 30 ημέρες.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΦΗΓΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκευάσματος παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, σταν αποθηκεύεται στην αρκική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο πλιακό φως.

Τομάτα, Μελιτάνια, Υπαίθρου: για την αντιμετώπιση του περονοστόρου και της αλτερνάριστης και στην Πίπερι Υπαίθρου για την αντιμετώπιση της αλτερνάριστης με 200 γρ/στρέμμα και με 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Εφαρμόζεται από το στάδιο του φυτώριου με ψεκασμούς που συνεχίζονται. Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόδους αποτελείται.

Κρεμμύδια, Λακούνια (Εσπελότ), Σκόρδο και Μαρούνι υπόθιρο: για την αντιμετώπιση της οκυρίδας με 250 γρ/στρέμμα και με 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος από το στάδιο του 5ου φυτών και έπειτα. Μέχρι 5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόδους αποτελείται. **Κολοκυνθοειδή (Κολοκυθή, Κολοκύθα,**

Πίπερι Υπαίθρου: για την αντιμετώπιση του περονοστόρου και της αλτερνάριστης και στην Πίπερι Υπαίθρου για την αντιμετώπιση της αλτερνάριστης με 200 γρ/στρέμμα και με 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος από το στάδιο του 5ου φυτών και έπειτα. Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόδους αποτελείται. **Μαρούλι Υπαίθρου:** για την

αντιμετώπιση του περονοστόρου με 200 γρ/στρέμμα και με 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Οι εφαρμογές είναι από το στάδιο των φυτώριων (ΒΒCH 12) και συνεχίζονται. Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόδους αποτελείται. **Πατάτα:** Για την αντιμετώπιση του περονοστόρου και της αλτερνάριστης με 200 γρ/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με καλό λουσίσμα των φυτών με 20-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Εφαρμόζεται το προστατευτικό από το φυτώμα των και έπειτα.

Μεσοδιάστημα εφαρμογών ανάλογα με την πίεση της ασθενείας, Αφήστε το φύλλωμα να στεγνώσει μετά από βροχή ή άρδευση πριν εφαρμόσετε το σκευάσμα. Μέχρι 8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόδους αποτελείται.

Παρατηρήσεις:

- Το MANCOZEB BIOFYA είναι ένα προστατευτικό συκοποτόκοντό.

- Η πρώτη εφαρμογή είναι καλό γινεται αμέσως πριν την προστεπόμενη εμφύτων της ασθενείας. Οι εφαρμογές επαναλαμβάνονται σύμφωνα με τα συνιτασμένα μεσοδιάστημα φυλλώματα για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αποτελείται προστασία.

- Το εύρος της δράσης είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής.

- Ως υπομονοποιούνται ως τροφή τα αμπελόφύλλα σε περιπτώση χρήσης του ΜΑΝΚΟΖΕΒ ΒΙΟΡΥΑ 80 WP.

- Η χρήση στο σκόρδο (υπάθρων) θα χορηγηθεί όπων και εάν κάποιας στην προστατευόμενη υγροποιητική υποχρεωτείται να ενημερωθεί μέσω της αρμόδιας αρχής. **Σκόρδο (Υπαίθρου):** Για την ωκεάσηση με 250 γρ/στρέμμα και με 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα από το 2ο σύλλογο και έπειτα. Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόδους αποτελείται.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το MANCOZEB BIOFYA πρέπει να χρησιμοποιείται προκεκτώντας να αποφεύγεται η ανάπτυξη ανθεκτικότητάς του σε μικτοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης. **Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα:** Η χρήση του σκευάσματος σε 250 γρ/στρέμμα και με 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα από το 2ο σύλλογο και έπειτα. Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόδους αποτελείται.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το MANCOZEB BIOFYA πρέπει να χρησιμοποιείται προκεκτώντας να αποφεύγεται η ανάπτυξη ανθεκτικότητάς του σε μικτοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης. **Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα:** Η χρήση του σκευάσματος σε 250 γρ/στρέμμα και με 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα από το 2ο σύλλογο και έπειτα. Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόδους αποτελείται.

Χρονικό διάστημα ασφαλέστερης μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύευσης: Δεν εφαρμόζεται στην περιπτώση των πολεμικών καλλιέργειών. Γενικά πρέπει να προτίθενται οι σδημές χρήσης της επικέτας όπως προς τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος σε κάθε προτεινόμενη καλλιέργεια.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Η ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥΣ.

Δεν είναι φυτοτοξικό στην προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Να μην χρησιμοποιείται στις ποικιλίες της ακλαδίας Κρυσταλλί, Κόσια και Βουτρότα. Μπορεί να προκαλέσει σκωριώσκων σε μηλές ποικιλίας Goldene Delicious.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά ήταν πρόκειται για μετασύλλεκτες ρίζες;