

ACARIDOIL 13SL

Potassium salts of fatty acids 13%

ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)

Εγγυημένη σύνθεση: Potassium salts of fatty acids (άλατα καλίου λιπαρών οξέων): 13,04 β/ο
βοηθητικές ουσίες: 83,27% β/β. Περιέχει caraway seed oil. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο για την καταπολέμηση του αλευρώδον σε τομάτα και αγγούρι. Συνιστάται επίσης για αφίδες, θρίπες, ακάρεα, κοκκοειδή, βαμβακάδα, ψύλλα, βρωμούσες και τζιτζικάκια, για τις καλλιέργειες που αναγράφονται στο φάσμα δράσης. Δρα δι' επαφής.



ΠΡΟΣΟΧΗ



Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Προκαλεί σοβαρό οιθαλαμικό ερεθισμό.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14.534 /24-09-2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 9,5 L

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα απομήκης προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. **Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Περιέχει caraway seed oil. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν δεν υποχωρεί ο οιθαλαμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Εάν παρατηρείτε ερεθισμούς του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777.



Κάτοχος της αδείας -
Παρασκευαστής VIORYL A.E.,
ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
28ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας,
190 14 Αριόνες, Απτικής, Τηλ.: 22950 45100,
e-mail: info@viorylagro.gr, www.viorylagro.gr

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης φυλλώματος. Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί δεν πρέπει να είναι «σκληρό». Αν είναι δυνατό να χρησιμοποιείται βρόχινο ή αποσταγμένο νερό. Δεν πρέπει να γίνεται εφαρμογή με μεγάλη υγρασία. Δεν πρέπει να ψεκάζονται φυτά που βρίσκονται σε κατάσταση stress. **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Ρίχνουμε μέσα στο ψεκαστικό δοχείο την απαιτούμενη δόση. Συμπληρώνουμε στη συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση. Η ανάδευση του ψεκαστικού διαλύματος συνεχίζεται μέχρι τον τερματισμό του ψεκασμού. **ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** –.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Συστίνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περιστέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:** Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων. Για όλες τις καλλιέργειες στο φάσμα δράσης: **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιέργεια**: 4. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 7-10 ημέρες. Πεδίο Εφαρμογής: **ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Γκρέιπ-φρουτ)**: Για Αλευρώδη, Αφίδες, Κοκκοειδή, Θρίπες και Ακάρεα, με 1900 κ.εκ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα. **ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Καρυδιά)**: Για Αφίδες, Θρίπες, Κοκκοειδή, Ακάρεα με 1900 κ.εκ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα. **ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά)**: Για Αφίδες, Κοκκοειδή, Θρίπες, Ψύλλα και Ακάρεα με 1900 κ.εκ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά)**: Για Αφίδες, Θρίπες, Κοκκοειδή, Βαμβακάδα, Ακάρεα, με 1900 κ.εκ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα. **ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υ+Θ)**: **(Τομάτα, Αγγούρι, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Φασόλι, Μπιζέλι, Κολοκυνθοειδή, Λάχανο, Κουνουπιδί)**: Για Αλευρώδεις, Αφίδες, Βρωμούσες, Θρίπες, Τούτα και Ακάρεα με 1500-1900 κ.εκ. σε 100 λίτρα και με 50-100 λίτρα

ψεκ. υγρού ανά στρέμμα. **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ, ΦΥΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ:** Για Αφίδες, Θρίπες, Κοκκοειδή και Ακάρεα με 1500-1900 κ.εκ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα. **Παρατηρηση:**

Στις καλλιέργειες υπαίθρου, να μην εφαρμόζεται κατά την περίοδο της ανθοφορίας, όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας και σε περίπτωση που εμφανίζεται μελίτωμα. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Να μην εισέρχονται άνθρωποι ή ζώα στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει οντελώς το ψεκαστικό υγρό. Αν εισέλθει εργαζόμενος στην ψεκασμένη περιοχή μετά τον ψεκασμό και πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, να φορά γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης. Στην αχλαδιά να χρησιμοποιείται ο καμπυλότερη δόση και να προηγείται δοκιμή στις ευαίσθητες ποικιλίες. **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Για όλες τις καλλιέργειες του φάσματος δράσης: –.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να αποθηκεύεται σε ξηρό, δροσερό, κλειστό και καλά αεριζόμενο χώρο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. Να προστατεύεται από συνθήκες παγετού. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

ΚΥΠΡΟΣ: Αρ. Αδείας: **2664**

1στρέμμα = 1 δεκάριο

Τηλ Κέντρου Διλογητριάσεων: **1401**

Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά / Διανομέας:



L. Lambrou Agro Ltd, Οθέλλου 11, 2540 Δάλι,
Βιομ. περιοχή Ιδαίου, τηλ: 22667908
e-mail: info@lambrouagro.com.cy

Ημερομηνία παραγωγής: Αρ. παρτίδας: επί της συσκευασίας