

# SINPRO 50SC

Iprodione (Ιπρονιόν) 50%

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ (SC)

**Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:** Iprodione: 50 % β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 56,1% β/β

**Μικητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Δρα με παρεμπόδιση της ανάπτυξης του μυκηλίου και της βλάστησης των σπορίων των ευαίσθητων μυκήτων.**

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 60435/18-12-2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1L

**Κάτοχος της σάσιας:** SINON EU GmbH Im Alten Dorfe 37 (Volksdorf), D-22359 Hamburg/Germany.

**Παρασκευαστής:** SINON CORPORATION,  
No. 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Road, Taichung 40357, Taiwan, ROC



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά / Συσκευαστής: BIORYL A.E., ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  
28ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας, 190 14 Αφίδνες, Αττικής,  
Τηλ.: 22950 45100, e-mail: info@viorylagro.gr, www.viorylagro.gr  
Εργοστάσιο παραγωγής: BIORYL A.E. Ελεόνας Θηβών



## Προσοχή

Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και τη περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ.** Φυλασσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιήστε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Μαζέψτε την χυμένη ποσότητα.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ –ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότης έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό για 10-15 λεπτά. Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής. Ζητείστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την επικέτα αν είναι δυνατόν. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Βγάλτε αμέως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα. Ξεπλυθείτε καλά με νερό για 15 λεπτά. Ζητείστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την επικέτα. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Βγάλτε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατείστε τον σε ανάπονο, καθιστού. Ζητείστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την επικέτα. **Σε περίπτωση κατάσπονσης:** Ξεπλύνετε το σόμα με νερό (μόνον αν το άτομο έχει τις αισθήσεις του). Μην προκαλείτε εμέτο. Ζητείστε ιατρική βοηθεία και δείξτε την επικέτα. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό. Ακολουθήστε συμπλωματική θεραπεία. **Τηλέφωνο Κέντρου Διπλητηρίασης:** 2107793777

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** ΑΝΑΚΙΝΕΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτετε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. **Συνδυαστικότητα:** - Καθαρισμός ψεκαστήρα Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βιτό. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνα του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βιτό και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναρχιπομούστε ξεπλύνετε το πάλι με άφθονο νερό. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αριστερά πάνω από τη συσκευασία με τρύπημα ή σχίσμη για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

## ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

| Πεδίο Εφαρμογής | Στάχος                      | Δόσεις σκευάσματος |   |                                 | Τρόπος & χρόνος εφαρμογής                                  | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|---|---------------------------------|--|--|
|                 |                             | κ. εκ./στρέμμα     | Γρ./100 λίτρα ψεκ., υγρού λίτρα/στρέμμα | Ογκος ψεκ., υγρού λίτρα/στρέμμα |  |  |
| ΑΜΠΕΛΙ          | Βοτρύπις (Botrytis cinerea) | 150                | 150-1000                                | 15-100                          | Σπν αλλαγή του χρωματισμού των ραγών ως την πλήρη ωρίμωνση | 1  |
| ΦΡΑΟΥΛΑ         | Βοτρύπις (Botrytis cinerea) | 150                | 300                                     | 50                              | Εφαρμογές από την άνθιση ως την πλήρη ωρίμωνση             | 1  |

**Πα την προστασία του χρήστη φορέστε:** -Κατά τη διάρκεια της ανάμειξης: Γάντια νιτριλίου σύμφωνα με το πρότυπο EN 374-3, Φόρμα εργασίας από 65% πολυεστέρα, 35% βαμβάκι 245g/m<sup>2</sup> με DWR (αδιάβροχο) και Μπολούζα προστασίας (EPI) κατηγορίας 3 και τύπου BP(3), πάνω από τη φόρμα εργασίας. -Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής: φόρμα εργασίας από 65% πολυεστέρα, 35% βαμβάκι 245g/m<sup>2</sup> με DWR (αδιάβροχο). Εάν η εφαρμογή γίνεται με τρακτέρ με καμπίνα: γάντια νιτριλίου σύμφωνα με το πρότυπο EN374-3 (από περιπτώση τρακτέρ με καμπίνα νέου τύπου η χρήση γαντών δεν είναι απαραίτητη παρά κατά τη διάρκεια εργασιών με το σύστημα εκτόξευσης και τα γάντια θα πρέπει να είναι αποθηκευμένα εκτός της καμπίνας). Εάν η εφαρμογή γίνεται με τρακτέρ χωρίς καμπίνα: γάντια νιτριλίου σύμφωνα με το πρότυπο EN374-3 για χρήση μόνο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εάν η εφαρμογή γίνεται με ψεκαστήρα πλάτης ή αυλό: γάντια νιτριλίου σύμφωνα με το πρότυπο EN374-3. -Κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού ψεκασμού: Φόρμα εργασίας από 65% πολυεστέρα, 35% βαμβάκι 245g/m<sup>2</sup> με DWR (αδιάβροχο) και μπολούζα προστασίας (EPI) κατηγορίας 3 και τύπου BP(3), πάνω από τη φόρμα εργασίας. Για την προστασία του εργάτη: να φορά φόρμα εργασίας από 65% πολυεστέρα, 35% βαμβάκι 245g/m<sup>2</sup> με DWR (αδιάβροχο). - Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε το εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). -Για την προστατεύση τους μεταξύ των υδάτων μην εφαρμόζετε σε δέσμη εδάφου (ρΗ μικρότερο από 6). **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Οι εργάτες μπορούν να εισέρχονται στην καλλιέργεια όπου έχει γίνει εφαρμογή μετά από 6 ώρες (ύπαιθρο) και 8 ώρες (θερμοκίπιο). **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλών και κάθε παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην επικέτα. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όπως προκέιται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:** Αμπελι 21 ηρές, Φράουλα 1 ημέρα. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας. **Ημερομηνία Παρασκευής:** Αριθμός παρτίδας: επί της συσκευασίας