



ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ.

Calmate (20% CaO)

Διάλυμα ασβεστίου

Εγγυημένη σύνθεση: % β/β

Ασβέστιο 20% (CaO)
από χλωριούχο ασβέστιο



Το Calmate εφαρμόζεται με διαφυλλικούς ψεκασμούς, προληπτικά και θεραπευτικά με άμεσα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της έλλειψης ασβεστίου. Εφοδίαζε τα φυλλώδη λαχανικά, τους καρπούς και τα φρούτα με ασβέστιο για κανονική ανάπτυξη και μακρά συντήρηση. **ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:** Προληπτικά με 1-2 λίτρα στον τόνο για ψεκασμούς. Θεραπευτικά στην έλλειψη ασβεστίου από 2 μέχρι το πολύ 5 λίτρα στον τόνο, ανάλογα με την καλλιέργεια. **Τομάτα:** Για την θεραπεία της ξηρής κορυφής ψεκάζουμε με 4 έως 5 λίτρα στον τόνο αργά το απόγευμα καλύπτοντας καλά τους καρπούς. Επαναλαμβάνουμε 2 φορές κάθε 7-10 ημέρες. Προληπτικά από την άνθιση και μετά. **Πιπεριά-Μελιτζάνα:** Ψεκάζουμε με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων με 3-5 λίτρα στον τόνο. Επαναλαμβάνουμε 2 φορές κάθε 10 ημέρες. **Λάχανο-Κουνουπίσι-Σέλινο,** άλλα λαχανικά: Ψεκάζουμε με 2-5 λίτρα/τόνο. **Μαρούλι:** Με 2 λίτρα/τόνο, προληπτικά πριν κλείσει η καρδιά, αλλιώς με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Επαναλαμβάνουμε 2-3 φορές κάθε 10 ημέρες. **Καρπούζι-Αγγούρι:** Προληπτικά ψεκάζουμε 2-3 φορές σε διαστήματα 10 ημερών την εποχή της ταχείας αύξησης των καρπών. **Φράουλα:** Ψεκάζουμε με 2-3 λίτρα/τόνο μόλις δέσουν οι πρώτοι καρποί 2-3 φορές κάθε 10-15 ημέρες. **Πατάτα:** Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων ψεκάζουμε 2-3 φορές σε διαστήματα 10-15 ημερών. **Βαμβάκι:** Ψεκάζουμε 2-3 φορές στα νεαρά σταδία για αύξηση της ζωτηρότητας και ενίσχυση του φυτού προκειμένου για ασθένειες. **Αμπέλι:** Ψεκάζουμε με 2 λίτρα στον τόνο, 2 φορές σε διαστήματα 10 ημερών μέσα στον Ιούνιο μετά το δεσμό, καλύπτοντας καλά τα σταφύλια. **Μπλιές-Αχλαδιές:** Για την πρόληψη της εμφάνισης της πικρής κηλίδωσης και της πρώσης φυλλόπτωσης, ψεκάζουμε με 2-5 λίτρα στον τόνο 3 φορές σε διαστήματα 20 ημερών ξεκινώντας από τον Ιούνιο και για τα μήλα μέχρι τον Αύγουστο. Μην ψεκάζετε όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 30°C. **Πυρνόκαρπα:** Ψεκάζουμε 1-2 φορές με 10-15 ημέρες διάσπατα όταν οι καρποί έχουν αναπτυχθεί στην ¼ του τελικού μεγέθους τους, για αύξηση της συνεκτικότητας της σάρκας τους και αντοχή στη μεταφορά και συντήρηση. **ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ:** Μετά από τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά το ψεκαστικό δοχείο. Μην ψεκάζετε όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή. Οι ψεκασμοί είναι αποτελεσματικοί όταν γίνονται κοντά στη δύση του πλοίου. Μην συνδυάζετε με λιπαράματα που έχουν ψηλές λιπαντικές μονάδες και κυρίως όχι με φωσφορούχα, ούτε με αλκαλικούς πολτούς. **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:** Αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε συνθήκες δωματίου, όπου παραμένει σταθερό για περισσότερο από 3 χρόνια.

Προσοχή, Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό. Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποκωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 L



Παρασκευάζεται από τη:

ΒΙΟΡΥ Α.Ε., ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
280 χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας, 190 14 Αφίδνες
Τηλ.: 22950 45100, e-mail: info@viorylagro.gr, www.viorylagro.gr

